

Instrucciones para el alta: Biopsia sin sedación: Toracocentesis, paracentesis, colocación de filtro en vena cava inferior (VCI)

Qué puede esperar

- Dolor o molestia leve en el sitio de la biopsia
- Drenaje sanguinolento leve en el sitio de la biopsia
- Fiebre baja de **32.7° [Sic]- 37.7°C (99°-100°F)**

Puede...

- Reanudar todos sus medicamentos (excepto los anticoagulantes)
- Tomar acetaminofén (Tylenol®) u otros analgésicos recetados
- Quitarse la venda o el apósito en 24 horas
- Ducharse una vez que se haya quitado la venda o el apósito

Restricciones

NO debe...

- Realizar ninguna actividad que requiera fuerza, ni levantar nada que pese más de 10 libras durante 24 horas
- Tomar anticoagulantes durante 24 horas (esto incluye la aspirina y el ibuprofeno /Advil®)

Llámenos si...

- Tiene signos de infección en el sitio después de los primeros días, como enrojecimiento, dolor (que no se alivia con analgésicos) o pus
- Tiene fiebre de **38° C (100.4° F)** o más alta con escalofríos que dura más de 24 horas
- Tiene sangrado excesivo en el sitio de la biopsia

Departamento de Radiología Diagnóstica: De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm. Teléfono: Después de las horas de atención, llame al número principal de Roswell Park (24/7): 716-845-2300.

Si le parece que su situación es de vida o muerte (tiene dolor en el pecho, dificultad para respirar, sangrado intenso), llame al 911 o diríjase a la sala de urgencias del hospital más cercano.